

Frühe Trauma- und Stresserfahrungen

- Prävention statt Medikalisierung -


Dr.med. Nevena Vuksanovic

Kinderklinik und Poliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital
Abteilung für Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie
Ludwig-Maximilians-Universität München


Übersicht




GEN X UMWELT
INTERAKTION



ADHS UND
TRAUMA




ADHS UND
STRESS



TAKE-HOME-
MESSAGE

A D H S - Entstehungsmodell




Legende:



Bisherige Forschung
ADHS Studie

Gen x Umwelt Interaktion



A D H S – Trauma Studie

Methoden

WER WURDE UNTERSUCHT?

ADHS - Gruppe

- Kind
- Eltern
- Lehrer / Erzieher

Kontrollgruppe

- Kind
- Eltern
- Lehrer / Erzieher

WAS WURDE ERHOBEN?

57. Greift andere körperlich an	0	1	2
58. Bohrt in der Nase, rupft oder kratzt sich an Körperstellen	0	1	2
Bitte beschreiben:	0	1	2
59. Spielt in der Öffentlichkeit an den eigenen Geschlechtsteilen	0	1	2
60. Spielt zu viel an den eigenen Geschlechtsteilen	0	1	2
61. Ist schlecht in der Schule	0	1	2
62. Ist körperlich unbeholfen oder ungeschickt	0	1	2
63. Ist lieber mit älteren Kindern oder Jugendlichen als mit Gleichaltrigen zusammen	0	1	2
64. Ist lieber mit Jüngeren als mit Gleichaltrigen zusammen	0	1	2
65. Weigert sich zu sprechen	0	1	2
66. Tut bestimmte Dinge immer und immer wieder, wie unter einem Zwang	0	1	2
Bitte beschreiben:	0	1	2
67. Lauft von zu Hause weg	0	1	2

FRAGEBÖGEN



INTERVIEW



PHYSIOLOGISCHE
MESSUNGEN



MUTTER-KIND
INTERAKTION




KOGNITIVE
FÄHIGKEITEN



GENETIK

A D H S und Polytrauma


nIPE's



Beispiel-Item

Hat Ihr Kind einen Autounfall erlebt?

IPE's




Beispiel-Item

War Ihr Kind Zeuge körperlicher Gewalt?

A D H S und Polytrauma

- Nur Jungen mit ADHS (ca. 20%) haben mehr als 5 traumatische Erlebnisse (IPE's + nIPE's)

- Die Anzahl der IPE's korreliert hoch signifikant mit der Ausprägung der ADHS-Symptomatik



A D H S und PTBS - Symptomatik



Test

Beispielitem

PROPS

Parent Report of Posttraumatic Symptoms

- Denkt an schlechte Erlebnisse
- Schaltet ab



ADHS-Gruppe

3-fach höheres Gesamtwert


Über 60% im klinisch auffälligen Bereich + 40% Varianz für Aufm.Stör.

Fallvorstellung Julian

- Julian, 8 Jahre
 - ADS, LRS
 - impulsive Durchbrüche
 - Intelligenz im oberen Durchschnittsbereich
 - desorganisiertes Bindungsmuster
 - Kindesmutter: körperliche Gewalt - Opfer und Täter
- AAP - Klassifikation U
- Kindesvater: kein Kontakt mit der Ursprungsfamilie

A D H S und Stress


Emotionaler Stressor



GEV-B

5 Geschichten, die das Bindungssystem aktivieren

Kognitiver Stressor



CMM + K-ABC

Aufgaben aus zwei Intelligenztests

Bedeutung für die Praxis

- Prävention
 - Kindergartenalter
 - Time Intensive statt Time Out
 - Eltern unterstützen
 - Präventionsprogramme

- Diagnostik
 - gezielte Traumadiagnostik
 - psychosoziale Faktoren stärker berücksichtigen

- Therapie
 - psychotherapeutische Intervention
 - Traumatherapie für Kind und Eltern
 - Medikamente nur als Notlösung

Unsere Projekte

PD Dr.med.habil K.H.Brisch

- 1° Prävention - **SAFE®** – Sichere Ausbildung für Eltern
Ein Trainingsprogramm zur Förderung einer sicheren Bindung zwischen Eltern und Kind
 - **B.A.S.E.® - Babywatching** gegen Agression und Gewalt zur Förderung der Empathiefähigkeit
- 2° Prävention - **SAFE Sucht®** - Sichere Ausbildung für Eltern mit Suchtproblematik (individuelle Betreuung)
 - modif. **B.A.S.E.® - Babywatching** als Interventionsprogramm bei Jungen mit ADHS-Symptomatik im Vorschulalter



ADHS – Trauma Studie

ADHS – Trauma Studie

Herzlichen Dank !!!

PD Dr.med. habil Karl Heinz Brisch
Dr.med. Kathrin Zeber
Dr.phyl. Christine Kern
Dipl.soz.päd. Evelyn Donth
Dipl.soz.päd. Sabine Frömmel
Sahar Mahmoodzah
Johanna Müller
Lara Fischer
PD Dr.med. Martin Bidlingmaier
Prof.Dr.med. Dan Rujescu-Bascu
Dr.biol. Anna Hartmann
Dipl.psych. Lis Keimeleder
Dipl.psych. Richard Koch
Dr.med. Katharina Göttler
Dipl.stat. Katharina Schüller

Herzlichen Dank !!!

Eltern und Kinder, die an der Studie
teilgenommen haben

Lukas-Grundschule, München
Europäische Schule, München
James-Krüss Grundschule, Gilching
Kindergarten Benjamin, Germering
Kinderland Jonathan, Germering

Studienstiftung des deutschen Volkes

ADHS – Trauma Studie

Einfluss von traumatischen Erfahrungen der Eltern
und des Kindes auf die Entwicklung
von Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörungen

PD Dr.med. habil Karl-Heinz Brisch
Karl-Heinz.Brisch@med.uni-muenchen.de
www.khbrisch.de

Dr.med. Nevena Vuksanovic
Tel. +49 89 44005 4699
nevena.vuksanovic@med.uni-muenchen.de

Pädiatrische Psychosomatik und Psychotherapie
Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunerschen Kinderspital
Ludwig-Maximilians-Universität München
Pettenkoferstr. 10
80336 München